

ANTISEPSIE EN PEDIATRIE

LOCALISATION ÂGE	MUQUEUSES	PEAU SAIN	PEAU LESÉE	OREILLES ⚠ pas d'Octénidine ⚠ pas de Chlorhexidine	YEUX
<p>PREMATURES - moins de 32 semaines d'âge gestationnel et moins de 15 jours de vie</p> <p>⚠ Pas d'iode sauf pour les yeux</p>	Octénidine (Octenisept®)	Octénidine (Octenisept®)	Octénidine (Octenisept®)		Chlorhexidine HUG collyre aqueux 0.05% (u.u.) OU Povidone iodée collyre aqueux 5% filtré (u.u.) (PVP iodé collyre 5% Bichsel)
<p>PREMATURES - moins de 32 semaines d'âge gestationnel et avec plus de 15 jours de vie - plus de 32 semaines d'âge gestationnel</p> <p>NOUVEAU-NÉS</p> <p>NOURRISSONS - de moins de 6 mois</p> <p>⚠ Pas d'iode sauf pour les yeux et oreilles</p>	Chlorhexidine aqueuse 0.5%	Chlorhexidine alcoolique 2% Sur petite surface	Chlorhexidine aqueuse 0.5%	Povidone iodée aqueuse 10% (Bétadine®) Sur petite surface	Chlorhexidine HUG collyre aqueux 0.05% (u.u.) OU Povidone iodée collyre aqueux 5% filtré (u.u.) (PVP iodé collyre 5% Bichsel)
<p>ENFANTS DE PLUS DE 6 MOIS</p>	Chlorhexidine aqueuse 0.5% OU Povidone iodée aqueuse 10% (Bétadine®)	Chlorhexidine alcoolique 2% OU Povidone iodée 4 % alcoolique (Bétaseptic®)	Chlorhexidine aqueuse 0.5% OU Povidone iodée aqueuse 10% (Bétadine®)	Povidone iodée aqueuse 10% (Bétadine®)	Chlorhexidine HUG collyre aqueux 0.05% (u.u.) OU Povidone iodée collyre aqueux 5% filtré (u.u.) (PVP iodé collyre 5% Bichsel)

Remarques :

- Les produits à base de Chlorhexidine et Octénidine ne doivent pas être en contact avec le cerveau, les méninges, l'oreille moyenne et le péritoine (risques de péritonite sclérosante).
- L'Octenisept® est exclusivement réservé pour les prématurés ainsi que lors d'allergies prouvées à la chlorhexidine ou à la povidone iodée. Son utilisation sur peau fragile doit se faire avec prudence et éviter toute macération.
- Les solutions à base d'iode sont contre-indiquées chez les bébés de moins de 6 mois, pendant la grossesse et chez les femmes pendant l'allaitement.
- Pour une antiseptie efficace, trois applications successives sont nécessaires, puis attendre que chaque couche sèche avant d'appliquer la suivante.
- Le choix de l'utilisation de la Chlorhexidine alcoolique 2% incolore ou colorée est laissé à l'utilisateur

Approuvé le 25.01.2013 par : A. Agostinho, N. Bochaton, A. Calza, A. De Rosso, C. Fonzo Christe, G. La Scala, R. Pfister, K. Posfay Barbe, I. Soulake, S. Veys, B. Wildhaber, W. Zingg

Pharmacie des HUG / [antiseptiques_DEA.docx](#) / créé le 23.11.2013 / auteur: ceft / dernière révision le 29.05.2015 par ceft,aldr,ieso

La pharmacie des HUG décline toute responsabilité en cas d'utilisation des informations disponibles sur son site internet hors des HUG

ANTISEPSIE CUTANEE PRE-OPERATOIRE EN PEDIATRIE

TYPE ÂGE		CHIR ORTHO		CHIR CARDIAQUE		CHIR VISCERALE		NEUROCHIRURGIE	
		Peau saine	Peau lésée	Peau saine	Peau lésée	Peau saine	Peau lésée	Peau saine	Peau lésée
PREMATURES - moins de 32 semaines d'âge gestationnel et avec moins de 15 jours de vie ⚠ Pas d'iode		Octénidine (Octenisept®)	Octénidine (Octenisept®)	Octénidine (Octenisept®)	Octénidine (Octenisept®)	Octénidine (Octenisept®)	Octénidine (Octenisept®)	Octénidine (Octenisept®)	
PREMATURES - plus de 32 semaines - moins de 32 semaines d'âge gestationnel mais avec plus de 15 jours de vie NOUVEAU-NÉS NOURRISSONS - de moins de 6 mois ⚠ Pas d'iode sauf en Neurochirurgie		Chlorhexidine alcoolique 2%	Chlorhexidine aqueuse 0.5%	Chlorhexidine alcoolique 2%	Chlorhexidine aqueuse 0.5%	Chlorhexidine alcoolique 2%	Chlorhexidine aqueuse 0.5%	Povidone iodée alcoolique 4% (Bétaseptic®) Sur petite surface	Povidone iodée aqueuse 10% (Bétadine®) Sur petite surface
ENFANTS DE PLUS DE 6 MOIS		Chlorhexidine alcoolique 2% OU Povidone iodée alcoolique 4% (Bétaseptic®)	Chlorhexidine aqueuse 0.5% OU Povidone iodée aqueuse 10% (Bétadine®)	Chlorhexidine alcoolique 2% OU Povidone iodée alcoolique 4% (Bétaseptic®)	Chlorhexidine aqueuse 0.5% OU Povidone iodée aqueuse 10% (Bétadine®)	Chlorhexidine alcoolique 2% OU Povidone iodée alcoolique 4% (Bétaseptic®)	Chlorhexidine aqueuse 0.5% OU Povidone iodée aqueuse 10% (Bétadine®)	Povidone iodée alcoolique 4% (Bétaseptic®)	Povidone iodée aqueuse 10% (Bétadine®)

Informations détaillées : Tableau des antiseptiques HUG (http://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/utilismedic/tab_antiseptiques.pdf)

Approuvé le 25.01.2013 par : A. Agostinho, N. Bochaton, A. Calza, A. De Rosso, C. Fonzo Christe, G. La Scala, R. Pfister, K. Posfay Barbe, I. Soulake, S. Veys, B. Wildhaber, W. Zingg

Pharmacie des HUG / [antiseptiques_DEA.docx](#) / créé le: 23.11.2013 / auteur: ceft / dernière révision le 29.05.2015 par ceft,aldr,ieso

La pharmacie des HUG décline toute responsabilité en cas d'utilisation des informations disponibles sur son site internet hors des HUG