



Hôpitaux Universitaires de Genève

Département de Psychiatrie

URGENCES

Centre de toxicologie de Zürich : 145

AMBULANCE : 144 (ligne directe)

Pharmacie :

Journée 8h-12h / 13h-17h : 37 23960

en dehors de ces heures, week-end et jours fériés :

Pharmacien de piquet (à domicile) : 079 743 01 05

Médecin de garde de psychiatrie générale
bip : 079 55 36992

Médecin de garde de psychiatrie gériatrie
bip : 079 55 36990

Interniste pour la psychiatrie générale
bip : 079 55 36950

Interniste pour la psychiatrie gériatrie
bip : 079 55 36951

En cas de non réponse en semaine 9h-18h

renseignements auprès de l'UCE

psychiatrie : 022 30 55430 ou 022 30 55440

En cas de non réponse en semaine 9h-18h

Renseignements auprès de l'UCE

Psychiatrie : 022 30 55430 ou 022 30 55440

Dès 18h00, week-end, jours fériés

demander le CDC de la Voie Orange

GSM : 079 55 34588

Dès 18h00, week-end, jours fériés

appeler la loge de l'Hôpital des Trois-Chêne

Tél : 022 30 56111 et demander le CDC de garde

Toutes les nuits de 23h-9h

téléphoner au SU : 022 37 50745

MEDICAMENTS DE LA VALISE D'URGENCE DE L'UNITÉ DE CONSULTATIONS ET EXAMENS (UCE)

Troubles cardiovasculaires	Indication et posologie (doses pour adultes)
Adalat CR [®] (nifédipine) 30 mg, 28 cpr	Crise hypertensive, notamment sous IMAO
Adrénaline 1 mg / 10ml, 10 amp	Arrêt cardiaque : injecter 0.1 à 0.5 mg i.v. (= 1 à 5 ml). Choc anaphylactique : 0.5 à 1 mg s.c.
Atropine 0.5 mg / 1 ml, 10 amp	Bradycardie sinusale, bradycardie post-infarctus (ECG) : 0.25-0.50 mg s.c. ou i.v.
Digoxine [®] 0.5 mg / 2ml, 5 amp	Fibrillation auriculaire, flutter et tachycardie supraventriculaire : 0.25 mg i.v. à répéter.
Inderal [®] (propranolol) 10 mg, 50 cpr	Angor instable, infarctus du myocarde
Lasix [®] (furosémide) 20 mg / 2ml, 5 amp	Oedème aigu du poumon : 20 mg i.v.
Nitroglycérine 0.8 mg subling, 30 caps	Crise d'angor : 1 caps à croquer
Perlinganit [®] (nitroglycérine) 50 mg / 50ml, 1 fiol	Crise d'angine de poitrine
Rapidocaïne 100 mg/10ml, 10 amp	Arrythmies ventriculaires (ECG) : 50-100 mg i.v.
Verapamil [®] (vérapamil) 5 mg / 2ml, 2 amp	Tachycardie supraventriculaire (sous ECG) : 2.5mg i.v.

Asthme	Indication et posologie (doses pour adultes)
Solu-Medrol® (methylprednisolone) 125 mg / 2 ml, 2 amp	Crise d'asthme, oedème de Quincke, choc anaphylactique : 0.8 mg / kg i.v.
Ventolin® (salbutamol) 5 mg / 5ml, 1 amp	Asthme et bronchospasme : 0.5 mg s.c.
Ventolin® (salbutamol) 1 nébuliseur	Asthme et bronchospasme : 2 inhalations
Epilepsie / convulsions	Indication et posologie (doses pour adultes)
Rivotril® (clonazepam) 1 mg / 1ml, 5 amp	Etat de mal épileptique : 0.5 mg i.v. répété
Hypoglycémie	Indication et posologie (doses pour adultes)
Glucose 4 g / 10ml, 10 amp	Hypoglycémie : 12 g i.v. répété
Coma aux opiacés / Coma aux BZD	Indication et posologie (doses pour adultes)
Anexate® (flumazénil) 0.5 mg / 5ml, 1 amp	Intoxication aux benzodiazépines : 0.1 mg i.v. répété
Naloxon® (naloxone) 0.4 mg / 1ml, 5 amp	Intoxication aiguë aux opiacés : 0.4-0.8 mg i.v.
Autres	Indication et posologie (doses pour adultes)
Akineton® (bipéridène) 5 mg / 1ml, 5 amp	Crise dystonique aiguë sous neuroleptique : 2.5 mg i.m. ou i.v.
Buscopan® (butylscopolamine) 20 mg / 1ml, 5 amp	Spasmes viscéraux : 20 mg i.m. ou i.v.
Morphine HCl 10 mg/ml (1%), 10 amp et solution 100 ml	A disposition dans chaque unité (casiers de sécurité)
Tavegyl® (clemastine) 2 mg / 2ml, 5 amp	Choc anaphylactique : 2 mg i.v.
Matériel et médicaments disponibles à l'unité de consultations et examens (UCE)	

- ECG portatif, à débrancher et utiliser sans courant, la batterie étant à l'intérieur; le rebrancher après emploi
- Défibrillateur Philips
- Insuline : 1 fiole d'Actrapid®, 1 fiole de Monotard® (au frigo)
- Ditanrix® (le vaccin renferme les toxoïdes diphtérique et tétanique désactivées et purifiées), 2 amp
- Clexane® seringues 20 mg/0.2ml (1x10), 40mg/0.4ml (1x10) et 60 mg/0.6ml (1x10)
- Matériel de suture
- Valise intubation