

## MÉDICAMENTS DE LA VALISE D'URGENCE DES UNITÉS DE SOINS DU DSMP

### Numéros de téléphones utiles :



Ambulance: 144  
Centre de toxicologie de Zürich: 145

Pharmacie des HUG jours ouvrables (8h-12h / 13h-17h): 022 37 23960  
Pharmacie des HUG hors heures d'ouverture: 079 743 01 05

Médecin de garde psychiatrie générale: 079 55 36992  
Interniste pour la psychiatrie générale: 079 55 36950

Médecin de garde de psychiatrie gériatrie: 079 55 36990  
Interniste de garde de psychiatrie gériatrie: 079 55 36951

**En cas de non réponse en semaine 9h-18h:** renseignements auprès de l'UCE psychiatrie : **022 30 55430** ou **022 30 55440**

**Dès 18h00, week-end, jours fériés**  
appeler la loge de l'Hôpital des Trois-Chêne  
Tél : **022 30 56111** et demander le CDC de garde

### Médicaments de la valise d'urgence des unités de soins du DSMP (Département de Santé Mentale et Psychiatrique) :

Troubles cardiovasculaires	Indication et posologie (doses pour adultes)
Adalat CR <sup>®</sup> (nifédipine) 30mg, 28 cpr	Crise hypertensive
Adrénaline 1 mg/10mL, 2 amp Adrénaline 5mg/5mL, 2 seringues prêtes à l'emploi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Arrêt cardio-respiratoire: 1 mg en i.v direct</li> <li>• Choc anaphylactique: 0.3 à 0.5 mg s.c.</li> </ul>
Atropine sulfate 1mg/5mL (0,2mg/mL), 2 seringues prêtes à l'emploi	Bradycardie sinusale: 0.5 à 1.0 mg s.c. ou i.v.
Asthme allergique/anaphylaxie	Indication et posologie (doses pour adultes)
Solu-Medrol <sup>®</sup> SAB (methylprednisolone) 125 mg/2 mL, 2 amp	Crise d'asthme, oedème de Quincke, choc anaphylactique: 0.8 mg / kg i.v.
Ventolin <sup>®</sup> (salbutamol), 1 nébuliseur	Asthme et bronchospasme: 2 inhalations, à répéter selon besoin
Tavegil (clémastine) amp 2mg/2ml, 5 amp	Choc anaphylactique: 2 mg i.v. lent
Epilepsie, convulsions	Indication et posologie (doses pour adultes)
Rivotril <sup>®</sup> (clonazepam) 1 mg/1mL, 5 amp	Etat de mal épileptique: 0.5 mg i.v. répété
Hypoglycémie	Indication et posologie (doses pour adultes)
Glucose 4g /10mL (40%), 10 amp	Hypoglycémie: 16g i.v. répété (4 ampoules) puis selon glycémie

Coma aux opiacés/Coma aux BZD	Indication et posologie (doses pour adultes)
Anexate® (flumazénil) 0.5 mg/5mL, 5 amp	Intoxication aux benzodiazépines: 0.1 mg i.v. répété
Naloxon® (naloxone) 0.4 mg/1mL, 10 amp	Intoxication aiguë aux opiacés: 0.4-0.8 mg i.v.
Autres	
Akineton® (bipéridène) 5 mg/1mL, 5 amp	Crise dystonique aiguë sous neuroleptique: 2.5 mg i.m. ou i.v.
Morphine 10 mg/mL (1%), 10 amp	A disposition dans chaque unité (casier de sécurité)

**Remarque:** une valise d'urgence plus complète (= valise des internistes) est disponible à l'unité de consultations et examens (UCE). Son contenu est disponible en consultant le document suivant: [http://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/medicurg/psy\\_valise\\_uce.pdf](http://pharmacie.hug-ge.ch/infomedic/medicurg/psy_valise_uce.pdf)